

# ！お知らせください

現在、もしくは過去に下記のお薬を服用（注射・点滴も含め）されたことがある方、  
下記の疾患の治療中、または治療経験のある方は、治療前にお申し出下さい。  
また、他の病院・診療所の紹介状、お薬手帳やお薬情報書などをお持ちの場合はお示し下さい。

マイナンバーカードでの確認も可能です

## 注意薬剤リスト（例）

### 骨吸収抑制薬

#### ビスフォスフォネート系薬剤(BP製剤)

##### ●経口ビスフォスフォネート製剤

ダイドロネル錠  
ボナロン錠  
ボナロン経口ゼリー  
フォサマック錠  
ベネット錠  
ボノテオ錠  
アクトネル錠  
リカルボン錠  
ボンビバ錠

アレンドロン酸錠（後発）

リセドロン酸ナトリウム錠（後発）

ミノドロン酸錠（後発）

##### ●注射用ビスフォスフォネート製剤など

ゾメタ点滴静注用  
ボナロン点滴静注用  
ゾレドロン酸点滴静注用  
パミドロン酸二Na点滴静注用  
リクラスト点滴静注用  
ボンビバ静注用

#### 抗RANKL抗体

ランマーク皮下注  
プラリア皮下注

#### 抗スクレロスチンモノクローナル抗体

イベニティ皮下注

等

### 血管新生阻害薬

#### マルチキナーゼ阻害薬

##### ●経口薬剤


スーテント  
ネクサバル  
ヴォトリエント  
スチバーガ  
カプレルサ  
レンビマ  
カボメティクス  
インライタ

#### 抗VEGFヒトモノクローナル抗体

##### ●点滴静注薬剤

アバスチン  
ベバシズマブBS（後発）

等



## 注意薬剤関連疾患リスト（例）

骨粗鬆症

多発性骨髄腫による骨病変

悪性腫瘍による高カルシウム血症

骨形成不全症

骨巨細胞腫

骨ページェット病


関節リウマチに伴う骨びらの進行抑制

脊髄損傷後・股関節形成術後の  
異所性骨化の抑制

固形癌骨転移による骨病変

〔 固形癌：乳がん、前立腺がん、肺がん、  
甲状腺がん、腎がんなど 〕

等



上記薬剤の副作用として、稀に顎骨壊死や骨髄炎を発症することが報告されています。  
服用中は日頃から歯および口の中を清潔に保つことを心がけ、口腔ケアを含む定期的な歯科医院の受診をお勧めします。  
ご不明な場合は、投薬・治療を受けられた病院・診療所にお問い合わせ下さい。

みなさまの安全のため、ご協力をお願いします



一般社団法人 兵庫県歯科医師会